



Prepared by
KH. MAIPAK SINGH
SMS-PLANT PROTECT

Published by
KRISHI VIGYAN KENDRA
Bishnupur district, Manipur-795134

Designed & Printed at:
S.K. PRINTERS WORKS,
NAMBOL, MANIPUR

FALL ARMY WORM

(Spodoptera frugiperda)



Published by
KRISHI VIGYAN KENDRA
Bishnupur district, Manipur-795134

Website: www.kvkbishnupur.com *Email:* kvkbishnupurdistrict@gmail.com

Year of Publication: 2024

Leaflet No.: 2403

FALL ARMY WORM (*Spodoptera frugiperda*)

তিল মপি অসি নুংদাংদা কিমি: ১০০ পাইবা ঔন্স মরুওইনা চুজাক পান্ধীদা নত্রগা চানান (sorghum), চু (sugarcane), গেছ (wheat), ফৌ (rice) চাথোকপা তিলনি।

তিলগী মওং মতৌ:

মরুম: মরুম অসি পুন্সপ পুন্স (egg mass) পান্ধীগী মনাদা অমোম মপিনা কোকই। মরুমশিং পুন্সাগা অমোমগী মতু-না চেকশিলনা যোমশিল্লি। মরুমশিং পুন্সাগা অমদা মরুম ১৫০-২০০ যাওই অমদি অমোম মপী অমনা জেনেরেসন অমদা ১২০০-১৫০০ চাংদা মরুম কোকপা ঔন্সী।

তিনখাক: Egg mass তগী তিনখাক ময়াম অমা পুন্সপ মচা ওল্লকই। কুপ্তবা অহানবা ইনসতা (1st instar) গী তিনখাক অসিনা পান্ধী মনাবু খোৎলগা চাথোকই। তিনখাক অসি স্তেজস ৬ (6 stages) লৈ হায়বদি ইনসতা ৬ (6 instars)। মরুমদগী মচা ওনবা তিনখাক অসি অশংবা মচু (Green colour) চেল্লি। মপুংফারবা তিনখাক্কা মকোজা হঙ্গামপাল মচু (Yellow colour) দা মথংঙ্গা ওনবা Y-shape লৈ অদুগা খাইদগী মনিং ওইবা শরুজা অমুবা স্কায়ার (Black Square)গী মওংদা দাক (spot) লৈ। মপুংফারবা তিনখাক অসি ষষ্ঠি মচু মাঞ্জি।

তিনগোং (Pupa): তিল অসিনা তিনগোং ওল্লমদাইদা লৈবাক্কি ২-৮ সিএম মনুং চংদুনা তিনখাজুগী তিনগোং ওল্লি।

মপি (adult): তিনগোংদগী মপি ওনলগা লৈবাক মনুংদগী নুংদাংদা পাইথোরকই। নুংদাংদনা হেনা মশা থিংই।

পান্ধীদা তিল তাবগী শক্তম: অহানবা তারকপা পিল্লবা তিনখাক্কা চাথোকপনা, পান্ধীগী মনাদা শাংনা-শাংনা খোৎলগা লৈবা উগনি। তিনখাক্কা অহুমশুবা ইনস্তা (3rd instar) ফাওবা চাওরবা কান্দা, চুজাক্কী মনাদা চাওনা অহোবা শেগাইবা উবা ফংগনি। অহুমশুবা ইনস্তা (3rd instar)দগী হেনা চাওরবা তিনখাক্কা, চুজাক ময়োন্দা শাইদংপা, চাথোকপগী মকুম ময়াম অমদি তিনখাক্কী মথী ময়াম উবা ফোংনা থেংনগনি।

Curtesy : ICAR Lamphelpat, Imphal

ইনটেগ্রেটেদ পেস মেনেসমেন্ট (Integrated Pest Management):

থিজন-হুমজিনবা (Monitoring): তিন অসিনা তাগনি হায়বগী চিংনবা লৈরদি লৌরাক অমদা ফেরোমোন ট্রেপস ৫ (pheromone traps 5) শিজিনবিয়ু (5trap/acre) চুজাক হুনবা মতমদসু।

চংতুনা য়েংশিনবা (Scouting): চুজাক পান্ধীনা ময়োন হেক চোংবগা হৌগদবনি।

১.	পান্ধীনা হেক হৌবদগী ময়োন হেক তাশিনবা মতাং (৩- ৪ চয়োল হেক হৌবদগী)	পান্ধীদা ৫% তিল অসিনা মাংহনলবদি হিদাক চাইবগী খৌরাং লৌখৎপিয়ু।
২.	পান্ধীনা ময়োন তাঙ্জাই তাশিনবগী মতাং (৫- ৭ চয়োল হেক হৌবদগী)	তাঙ্জাই ময়োন তাশিনবা পান্ধীদা ১০% তিল অসিনা মাংহনলবা অমসুং ফজনা ময়োল তাশিল্লবা পান্ধীদা ২০% তিল অসিনা মাংহনলবদি হিদাক চাইবগী খৌরাং লৌখৎপিয়ু।
৩.	পান্ধীনা লৈ শাংপা হৌবদগী লৈ শাংলবা মতুংগী মতম (মইহে য়াল্লমদাই অমসুং য়াল্লবা মতুং)	তিল হিদাক চাইবিগনু-চুজাক্কী মইহে তল্লাকপা মতমদা ১০% তিল তারবদি- তঙাইফদনা তিল হিদাক চাইবিয়ু।

লৌউ-শিংউগী পাথাপ (Cultural measures):

- ১। কালেন খোইরগা লৌবুক অদুবু নুংশা মঙাল ফজনা য়ৈহন্দুনা লোৎলিবা তিনখাক, তিনগোং ময়ামবু হাভোকপা অমসুং হৌরিবা নপী মপান্ধী শেংনা পেংথোকপিয়ু।
- ২। মতম চানা চুজাক থাবিয়ু অমদি তোঙান-তোঙানবা মতমদা য়াল্লা থেংনবা মতমদা থাবিগনু।
- ৩। হরাইগী পান্ধীশিং খুদম ওইনা লৈবাক হরাস, নুং হরাই, মাইরোংবীগা চুজাক্কা পরেং নাইনা থাবিয়ু।
- ৪। কা-হেনা ষষ্ঠি-ষনয়ুংগী হার অমদি রাসায়ানগী হার লৌবুজা হানা তৌবিগনু।
- ৫। চেংনা কোনশিনবা চুজাক্কী মখল (variety) তিনাশিংদগী ঙাকথোকপা পিগনি।

মেকানিকেল মিজরস (Mechanical Measures):

- ১। তিল অসিগী egg mass অমদি তিনখাকপু পিকলিঙৈ মতমদা থিরগা হাংতোকপিয়ু।
- ২। তিল তারবা চুজাক পান্ধীগী ময়োন মনুংদা অকংবা লৈঙেই নত্রগা শুনুগা তোৎলবা লৈবাক @ 9:1 (লৈবাক: শুনু) হাপচিনবিয়ু।
- ৩। মপী লাবা ফানবা pheromone traps শিজিন্নবিয়ু @15/acre।

বাইও-কন্ট্রোল (Bio-Control):

- ১। পান্ধী মখল ময়াম, লৈরাং শাংপা পান্ধী অমদি হরাইগী শাগৈ য়াওনা চুজাক পুন্সপ থামিল্লবদি, লৌউবগীদমক হানারবা তিল ময়াম হেনগৎলক্কনি।
- ২। বাইওপেস্টিসাইদস (Biopesticides): বাইওপেস্টিসাইদস অসি ঙল্লিঙৈদা পান্ধী নৌরিঙৈ মতমদা, ৫% পান্ধী নৌরিঙৈ মতমদা, ৫% পান্ধী শোঙ্কবা অমদি মইহে তল্লকপা মতমদা ১০% পান্ধী শোঙ্কবা শিজিন্নবিয়ু।

এ) এন্টোমোপেথোজেনিক (Entomopathogenic) কোকফাই-শুজাগী ফোরমুলেসন্স (formulations):

Metarrhizium anisopliae talc formulation (1x10⁸ cfu/g) @ 5g/tire ময়োন মনুং তল্লা কাপশিনবিয়ু। নুমিৎ ১০নি লৈরগা, হিদাক অসি ১-২ হানা কাপপিয়ু, তিল তাবগী মতুংহা নত্রগা *Nomuraea rileyi* rice grain formulation (1x10⁸ cfu/g)@3g/litre ময়োন তল্লা কাপপিয়ু। নুমিৎ ১০নিগী মতুংদা, তিল তাবগী মতুংইনা অমুক্কা হনা ১-২ হিদাক হনা কাপপিয়ু।

বি) *Bacillus thuringiensis* v. kurstaki formulations @2g/litre ঈশিংদা য়াল্লগা চায়বিয়ু।

কেমিকেল কন্ট্রোল (Chemical control):

- ১। অহানবা window (চুজাক হেক হৌবদগী ময়োন তাশিনবা হৌবা মতাং): ৫% damage চুজাক পান্ধীশিংদু উবা ফংবা মতমদা, 5%NSKE/Azadirachtin 1500ppm @ 5ml/titre চাইবিয়ু।

- ২। অনিশুবা window (পান্ধী ময়োন তাঙ্জাই তাশিনবগী ময়োন ফজনা-তাশিনবা মতাং): তিলনা শোকহনবা অসি ১০%-২০% য়ৌরা কান্দা অনিশুবা অমসুং অহুমশুবা ইনস্তা (2nd & 3rd instar) তিনখাকপু হাংনবা Emamectin benzoate @4g/10 litre natraga Spinosad @ 3ml/10 litre নত্রগা Thiomethoxam 12.6% + Lambda cyhalothrin 9.5%@ 5ml/10 litre ঈশিং নত্রগা chlorantraniliprole 18.5% SC @3ml/10 titre ঈশিং নত্রগা ঈশিংদা থিংলগা চাইবিয়ু।

- ৩। শি-নবা হিদাক হানা (): মপুং ফাদৌরবা তিনহাংপু হু হাপ্পগা মচিঞ্জাক শিজিন্দুনা হাংপিয়ু। চেংকুপ কেজি ১০গী চিনি অঙাংবা কেজি ২ ঈশিং লিটর ২- ৩দা থিংপিয়ু অদুগা পুং ২৪ ফল্লাবা থমবিয়ু। Mixture অসিদা গ্রাম ১০০ Thiodicarb শিজিন্দুঙৈ মমাং তোংশিনবিয়ু অদুগা চুজাক ময়োন্দা খরা খরা হাপপিয়ু।

- ৪। অহুমশুবা window (হৌবদগী হাপ্তা ৮গী মতুংদা পান্ধীনা লৈ শাংপা অমদি শাংলবা মতুংহনা): তিল হিদাক কপপাল্লমতাং অসিদা য়াদ্বে। খুংনা ফোইবনা হেনা ফগনি।